

โรคไตวายเรื้อรัง

ไตสูญเสียการทำงาน ทีละน้อยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาแรมเดือน/ปี

ไม่สามารถรักษาให้ไต
กลับมาเป็นปกติได้



เพลีย
เหนื่อย
หอบ

ปัสสาวะ
น้อยมาก

บวม
กดบวม

เบื่ออาหาร
คลื่นไส้
อาเจียน

คัน
ตามตัว

หมดสติ
เสียชีวิต



บทความ อาการของผู้ป่วยที่เป็นโรคไต

โรคไตวาย

เฉียบพลัน VS เรื้อรัง แบบไหนน่ากลัวกว่ากัน

ไตวายเฉียบพลัน

เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด
ภายในไม่กี่วัน

- ปัสสาวะน้อยลง หรือไม่ปัสสาวะเลย
- อาจมีอาการบวมที่ขาและเท้า
- อาจมีเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน มึนงง อ่อนเพลีย
- อาจมีอาการปวดหลังบริเวณชายโครง
- อาจมีหายใจที่เร็ว หากมีภาวะเลือดเป็นกรดหรือน้ำท่วมปอด
- ถ้าอาการรุนแรง อาจชักหรือหมดสติ
- บางรายต้องทำการบำบัดทดแทนไตชั่วคราว จนกระทั่งภาวะไตวายฉับพลันดีขึ้น

ไตวายเรื้อรัง

ภาวะที่ไตทำงานลดลงมาเป็น
ระยะเวลาหลายเดือนขึ้นไป

- โดยไตวายเรื้อรังในระยะสุดท้ายนั้น
ไตจะไม่สามารถขับของเสียได้ ผู้ป่วย
มักเกิดภาวะแทรกซ้อนหลายประการ
- น้ำหนักลด
 - ปัสสาวะผิดปกติ
 - โลหิตจาง
 - ระบบประสาทผิดปกติ
 - อาจเกิดน้ำท่วมปอดได้

เมื่อไหร่ต้องฟอกเลือด


โรคไตวายเรื้อรัง เมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้ายต้องรับการบำบัด
ทดแทนไต ซึ่งการฟอกเลือดเป็นหนึ่งวิธีสำคัญที่ช่วย
ทดแทนการทำงานของไตโดยปัจจุบันมีการฟอกเลือด

ด้วยเครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูง
Online Hemodiafiltration (OL-HDF)



โรคไตเรื้อรัง

สภาวะที่ไตถูกทำลาย
มีผลทำให้ความสามารถของไตในการทำงานลดลง



ไตที่มีสุขภาพดี

ไตที่เป็นโรค

ผู้ที่เริ่มมีอาการของโรคไต
ในช่วงแรกแทบไม่มีสัญญาณเตือน
โดยอาการมักจะปรากฏในช่วงระยะท้ายๆ
เมื่อไตได้รับความเสียหายไปมากแล้ว

แบ่งออกเป็น 5 ระยะ



ระยะที่ 1

eGFR $\geq$ 90%
ไตปกติหรือเริ่มเสื่อม



ระยะที่ 2

eGFR 60-89%
ไตเสื่อมเล็กน้อย



ระยะที่ 3

eGFR 30-59%
ไตเสื่อมปานกลาง



ระยะที่ 4

eGFR 15-29%
ไตปกติหรือเริ่มเสื่อม



ระยะที่ 5

eGFR $<$ 15%
ไตวายระยะสุดท้าย