

ฉบับปรับปรุง วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. 2564 นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น  
แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล  
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

### คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วย COVID-19

ผู้ป่วย COVID-19 ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง อาจอยู่ในระยะคลื่นที่ ๑ แล้วไปเก็บตัวต่อที่สถานที่รักษาให้ ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยจะด้อย แต่ในช่วงปลายสัปดาห์แรกผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการมากขึ้นได้ ผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรืออาการดีขึ้นแล้ว อาจจะยังตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของ COVID-19 ในน้ำลายและ/หรือน้ำเสบของผู้ป่วยได้เป็นเวลานาน อาจใช้จนถึง 50 วัน สำหรับไวรัสโคโรนา 2019 วิทยาศาสตร์ทางทันตแพทย์จะพยายามดูด้านข้าง แต่ยังไม่แน่ชัดว่านานขึ้นกี่วัน สารพันธุกรรมที่ตรวจพบหลังจากผู้ป่วยมีอาการนานๆ อาจเป็นเพียงชาติสารพันธุกรรมที่หลงเหลือที่ร่างกายยังกำจัดไม่หมด นอกจากนี้การตรวจพบสารพันธุกรรมได้หรือไม่ได้ ยังอยู่ที่คุณภาพของตัวอย่างที่เก็บตัวอย่าง การตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อหลังจากพ้นระยะ潜伏ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยรายนี้นับแต่เดือนที่ได้

ดังนั้นในแนวทางเวชปฏิบัติฯ COVID-19 นี้ จะระบุว่าไปต้องห้าม รพสส ก่อนอนุญาตให้ผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาล เพราะไม่ใช่ผลลัพธ์ของการรักษา ทั้งนี้แพทย์ผู้รักษาจะพิจารณาจากอาการเป็นหลักตามเกณฑ์ข้างต้น ผู้ป่วยที่พัฒนาการแพร์เซ็นต์แล้วสามารถดูแลรักษาได้ตามปกติ การปฏิบัติตามในการป้องกันการติดเชื้อเมื่อตอนประชามแห่งวัว จนกว่าจะควบคุมการแพร์เซ็นต์โรคในวงกว้างได้อย่างทันท่วงที

### คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วย COVID-19 ที่แพทย์จ้างมายังให้กลับไปเก็บตัวที่บ้าน จนครบกำหนด ๑๔ วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่เริ่มมีอาการหรือวันที่ตรวจพบเชื้อตัวไม่มีอาการ)

- จดออกจากรหัสไปรษณีย์ทุกกรณี ยกเว้นการเดินทางไปโรงพยาบาลโดยการนัดหมายและการจัดการโดยโรงพยาบาล
- ให้แยกห้องนอนจากผู้อื่น ตัวเองห้องนอนแยกให้远จากผู้อื่นอย่างน้อย 3-5 เมตร และต้องเป็นห้องที่เป็นห้องให้อาหารและน้ำดื่ม ผู้ติดเชื้อนอนอยู่ตัวเดียวได้ลงหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องชุดที่บ้านยืนยัน (Community Isolation) จนทันระยะการแยกโรค
- ถ้าแยกห้องน้ำได้ควรแยก ถ้าแยกไม่ได้ ให้เข็มพื้นผิวที่ไม่ทำสัมผัสด้วยปากท่าทางที่สะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์หลังการใช้หุ่นเครื่อง
- การดูแลสุขอนามัย ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น
- ถ้ามีตัวอย่างสputum เป็นประจำ โดยเฉพาะหลังจากดื่มน้ำปั่นอาหารหรืออุจจาระ หรือถ้ามีตัวอย่างเหลวลดก่ออ่อง 70%
- ไม่รับประทานอาหารร่วมวงกับผู้อื่น
- หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นในระยะไม่เกินสองเมตร การหันหน้าให้ตรงหน้ากันให้ส่วนหน้ากากหลอกเวลา
- ตื่นน้ำสะอาดให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่สุก สะอาด และวิปป์โซล่าครับด้วยน้ำอุ่นโดยอ้อย 70%
- หากมีอาการป่วยเกิดขึ้นใหม่ หรืออาการเดิมมากขึ้น เช่น ไข้สูง ไอมาก เหนื่อย แม่เหล็กห้าก หอบ หายใจลำบาก เป็นอาหาร ให้ติดต่อสถานพยาบาล หากต้องเดินทางมาสถานพยาบาล แนะนำให้สวมหน้ากากกระหน่ำเดินทางตลอดเวลา
- หลีกจากครอบครัวที่ต้องการติดต่อทุกๆ วันไม่ได้ สามารถประทับติดต่อทางสื่อสาร และที่จำเป็นได้ตามปกติตามแนวทางวิธีชีวิตใหม่ เช่น การสpeakโทรศัพท์มือถือร่วมกับผู้อื่น การทำความสะอาดและอาบน้ำ การรักษาภาระห้างเป็นต้น

หากมีข้อสงสัยใด ๆ สอบถามได้ที่โรงพยาบาลที่ท่านไปรับการรักษาหรือ  
สายตัวน้ำ โทร. 1422 หรือ 1668